







LMETGE



H, 17 ans


Contage tuberculeux































Diagnostic ?









Diagnostic :

Continuation Azygos
de la veine cave inférieure



Evolution-Discussion-Point fort

0,6% des malformations congénitales

Par hypoplasie segmentaire segment supra rénal de la VCI

Drainage veines hépatiques directement dans atrium droit

Isolée

Ou associée à un syndrome polymalformatif

- Isomérisme gauche ou syndrome de polysplénie
- Isomérisme droit ou asplénie
- situs inversus abdominal



Evolution-Discussion-Point fort



Dilatation crosse azygos


Déplacement de la ligne
paravertébrale droite



Evolution-Discussion-Point fort



Absence de veine cave rétro hépatique
+ dilatation veine azygos (> 6mm)



Drainage des veines hépatiques en
atrium droit





Références

Imagerie diagnostique et thérapeutique de la veine cave supérieure

M.ElHajjam,P-Y Marcy, A Lacout, M Bensalah,
C.Lagrange,J.Desperramons, C.Hardit, S. Binsse, P. Lacombe

In Imagerie thoracique de l'adulte et de l'enfant
:2012.:Elsevier Masson; 921-48

Imagerie de l'anatomie normale, des variantes anatomiques, et des pathologies de la VCI.

JP Tasu,J.Rouquier,L.Rocher,Y.Rondeau.A Miquel, M.Blery

Feuil.Rad,1999(39), 47-61.