




F, 38 ans

Maladie familiale connue

ATCD d'exérèse d'une tumeur glomique
tympano-jugulaire

Suspicion d'une petite lésion intrapéricardique
sur une IRM en 2005 (Normale en 2003)







Tardif






Diagnostic ?



Diagnostic ?

**Paragangliome
intrapéricardique**



Scintigraphie à l'octréotide

- Petit foyer persistant tympano-jugulaire
- Fixation intense médiastinale



- Importance de bien décrire les rapports anatomiques
- Rapport très intime avec le bord supérieur de l'artère pulmonaire droite (APD)
- Résection sous CEC par précaution
- Brèche dans l'APD lors de l'intervention



Evolution-Discussion-Point fort

Paragangliome

- = « Phéochromocytome extra-surrénalien »
- cellules chromaffines extra-surréaliennes
- svt syndromique (Von Hippel-Lindau, NF 1, MEN 2)
- jeunes adultes
- sécrétant / non sécrétant
- 20-40% avec métastases
- habituellement > 3 cm
- masse hétérogène avec prise de contraste ++ et nécrose / hémorragie



Evolution-Discussion-Point fort

Masses hypervascularisées médiastinales

- Paragangliome / phéochromocytome
- Adénomégalie (Castelman / adénocarcinome rénal)
- Tumeur carcinoïde
- Hématopoïèse extramédullaire
- Varices œsophagiennes
- Sarcome de Kaposi
- Hémangiome
- Goitre plongeant
- Adénome parathyroïdien ectopique
- Tumeurs neurogéniques (neuroblastome, neurofibrome, schwannome)