



L.METGE; C. FREITAG

Homme, 79 ans , diabétique et hypertendu traité,

Altération de l'état général depuis 1 mois

Douleurs scapulaires mal calmées par antalgiques ;

Infiltration il y a 15j.

Chute à domicile → douleurs coude (RX normales)


TDM encéphalique normale

Début d'escarre sacrée



Antécédents


- stents coronaires
- Tumeur de prostate (2005) Chirurgie
+radiothérapie
- Anémie par carence martiale







- Impotence fonctionnelle de l'épaule infiltrée.
- Diagnostic et traitement d'arthrite de l'épaule sous arthroscopie
- Puis coma fébrile (staphylocoque doré méthy S)
- Désaturation









Diagnostic ?





Reconstruction à l'isocentre



Diagnostic :

Anévrisme mycotique du TBCA



Evolution-Discussion-Point fort

Indication chirurgicale

Coronarographie préopératoire (« normale »)

Place du coroscanner

Transfert en chirurgie cardio- vasculaire



Evolution-Discussion-Point fort

Anévrismes des troncs supra aortiques

Pour une série de 74 cas M. Cury & coll :

63% dégénératifs

24% iatrogènes

8% traumatiques

3% génétiques

1% mycotiques



Référence

Cury M, Greenberg RK, Morales JP, Mohabbat W, Hernandez AV.

Supra-aortic vessels aneurysms: diagnosis and prompt intervention.
J Vasc Surg. 2009 Jan;49(1):4-10.