



G.Durand

Femme , 55 ans , opérée en 2010
d'une
tumeur pariétale thoracique :
Diagnostic ?








2013 : récurrence
contralatérale


sf : gêne lors des
mouvements de l'épaule

diagnostic ?











Diagnostic ?



ELASTOFIBROME THORACIQUE

TUMEUR OU PLUTÔT PSEUDO TUMEUR rare , secondaire a l'augmentation du tissu collagène qui alterne avec des ilots graisseux.

Lésion du sujet agé actif , nette prédominance féminine

Localisation spécifique: en avant de la pointe de l'omoplate (entre la paroi du tx et les muscles superficiels et la scapula

Caractère bilatéral simultané ou successif ++

En général latent ou peu symptomatique



Imagerie :

échographie : masse tissulaire avec échostructure hétérogène stratifiée en dehors de la paroi thoracique

TDM : masse tissulaire , +/- limitée , entre la paroi et les muscles (grand dentelé) et la scapula

contenu hétérogène spécifiquement en strates avec zones grasses caractère bilat. , pas d'atteinte osseuse++

IRM : T1 tissu fibreux (sg faible) et grasse (sg intense)

T2 tissu fibreux (sg faible) grasse (sg intermédiaire)

STIR : signal faible et intense

injection: rehaussement variable



bibliographie

- Elastofibroma dorsi
acta path microbiol scand 1961;144 : 83-4
Jarvi OH , Saxen AE
- Imagerie de l'élastofibrome dorsal
Revue du rhumatisme 71 (2004) 1143-1149
Malghem J. et coll.