



A. Khalil

Patiente âgé de 72 ans

Hémoptysie de faible abondance





A. Khalil

- Homme âgé de 54 ans est suivi pour un CBNPC en 4^{ème} ligne de chimiothérapie
- Oxygénothérapie à domicile
- Expectoration hémoptoïque et une hypoxie à


PaO ₂ (mmHg)	53
SaO ₂ (%)	86
PH	7.42
PCO ₂ (mmHg)	41

5 Juillet 2013


Sténose serrée de l'AP gauche



12 Juillet 2013






	Avant	Stent1
PaO ₂ (mmHg)	53	63
SaO ₂ (%)	86	92
PH	7.42	7.42
PCO ₂ (mmHg)	41	42








29 Juillet 2013



29 Juillet 2013






5 Juillet 2013



11 Juillet 2013



29 Juillet 2013

	Avant	Stent1	Stent2
PaO ₂ (mmHg)	53	63	74
SaO ₂ (%)	86	92	95
PH	7.42	7.42	7.41
PCO ₂ (mmHg)	41	42	41



Diagnostic ?



Diagnostic

- Hypoxie sur sténose de l'AP gauche sur un poumon irradié
- Nette amélioration de l'hypoxie par la pose d'une double prothèse couverte (Viaban 11 mm)