



M. EL HAJJAM


P. LACOMBE

Femme, 70 ans



AEG

Masse pulmonaire gauche





Biopsie Aiguille coaxiale 18G





Diagnostic ?



Diagnostic

Lymphome malin non Hodgkinien



Biopsie compliquée de : **Hémoptysie importante**
Hémorragie alvéolaire
Hémothorax gauche


Patiente asymptomatique
Evolution favorable



Discussion

Atteinte parenchymateuse pulmonaire :

- Souvent secondaire à une atteinte ganglionnaire médiastinale par contiguïté ou par dissémination.
- Les lymphomes pulmonaires primitifs sont rares: 3 à 4% des lymphomes extra ganglionnaires.
- **Micronodules, nodules** et/ou **masses**: souvent multiples, peuvent être excavés ou siège d'un bronchogramme.




Masse excavée du LM





Atteinte parenchymateuse pulmonaire :

- Condensation parenchymateuse unique ou multiples, souvent siège d'un bronchogramme, peut s'associer à des signes de distorsion.
- Réticulations septales associées à un épaissement péri-bronchovasculaire simulant une lymphangite carcinomateuse



Condensation parenchymateuse unique sans bronchogramme chez une jeune femme de 37ans atteinte d'une MDH

Multiples condensations sans bronchogramme



Réticulations septales associées à un épaississement péri-bronchovasculaire et à des micronodules périphériques.