Nodule pulmonaire solitaire

Marie-Pierre Debray Hôpital Bichat, Paris
Marrakech, Mai 2012

Définition

- Hyperdensité pulmonaire focale
- Rond ou ovale
- < 3 cm de diamètre
- 1 à « quelques » nodules

Incidence

Population générale

- Cleveland chest survey *Holin Am Rev Tuberc 59*
 - 0,2 % par radiographie thoracique (nodule > 1 cm)

Population à risque

- Dépistage fumeurs > 60 ans (ELCAP) *Henschke Lancet 99*
 - 7 % par radiographie thoracique dont 50% non confirmés
 - 23% par scanner
- Réduction de volume pulmonaire *Hazelrigg Ann Thorac Surg 97*
 - 39%

Nodules manqués sur la radiographie thoracique

- Taille minimale de détectabilité d'un nodule en radiographie : 6-7 mm
- 19% de cancers bronchiques manqués sur la lecture initiale de la radiographie mais visibles rétrospectivement *Quekel Chest 99*

- Cancers bronchiques manqués
Lobes supérieurs 72%

Périphériques 85%

Shah Radiology 03

Les «faux» nodules pulmonaires

■ Lésions pleuro-pariétales

- Cal costal, ilôt condensant costal
- Ostéophyte vertébral
- Calcification chondrocostale
- Nodule cutané, mamelon
- Plaque pleurale, nodule pleural

■ Lésions vasculaires

- Malformation artérioveineuse pulmonaire
- Anévrisme artériel pulmonaire

■ Impactions mucoïdes

Gamme étiologique

Lésions malignes

- Primitives
 - carcinome bronchique non à petites cellules
 - carcinome bronchique à petites cellules
 - lymphome, carcinoïde
- Secondaires
 - avec ou sans cancer extra-thoracique connu

Lésions bénignes

- Infectieuses
 - granulome infectieux
 - pneumonie ronde, abcès, embole septique
- Tumorales
 - hamartome, chondrome, fibrome, léiomyome, lipome
- Congénitales
 - kyste bronchogénique
- Autres
 - ganglion intrapulmonaire
 - pneumonie organisée, infarctus pulmonaire, atélectasie ronde
 - nodule rhumatoïde, Wegener, nodule amyloïde, sarcoïdose
 - pneumonie lipidique, foyer de fibrose ou d'inflammation

Nodule pulmonaire et ATCD de cancer extra-pulmonaire

Nodule pulmonaire isolé non calcifié > 5 mm et cancer extra pulmonaire
149 patients
Quint Radiology 2000

Etiologie du nodule pulmonaire			
Type de cancer extra-pulmonaire	Métastase	Primitif bronchique	Lésion bénigne
Tête et cou	3	25	5
Lymphome, leucémie	0	8	6
Sein, estomac, œsophage, ovaire, prostate, vessie, col utérin	8	26	11
Colon, rein, thyroïde, utérus, thymus	16	13	2
Mélanome, sarcome, testicule	23	9	6

Les éléments du diagnostic

- Contexte clinique
- Facteurs de risque
 - Tabagisme
 - Antécédent de cancer
 - Fibrose pulmonaire
 - Exposition à l'amiante
 - VIH
 - Âge

Les éléments du diagnostic

■ Radiographie ou scanner antérieur

Stabilité sur 2 ans indicateur « classique » de bénignité

- Données radiographiques années 50
- Valeur prédictive bénignité = 65% ? *Yankelevitz AJR 97*
- Prudence accrue pour les petits nodules

Bilan pré-opératoire d'une tumeur urothéliale
Demande de ponction trans thoracique

Les éléments du diagnostic

- Caractérisation par scanner
 - Taille
 - Contours et forme
 - Situation
 - Densité spontanée
 - Prise de contraste

- Technique du scanner

- sans injection
- coupes millimétriques
- faible dose pour le dépistage
- dose standard pour la caractérisation

- Taille

Augmentation de la probabilité de malignité avec la taille du nodule

> 3 cm → 95% malin

< 1 cm → 8-58% malin

< 5 mm → < 1% malin

Midthum Lung Cancer 03

- **Contours et forme**

- Spiculés, irréguliers, lobulés en faveur de la malignité
 - ↳ spiculés hautement suggestif de malignité
 - sans valeur si bordé d'emphysème
- > 20% nodules de contours réguliers sont malins
- Forme polygonale en faveur de la bénignité

Atélectasie ronde ou par enroulement

- au contact de la plèvre
 - interposition partielle possible de parenchyme aéré entre nodule et plèvre
- épaissement pleural contigu
- déplacement arciforme des vaisseaux → pôle antihilaire
- ↓ volume lobe

Mc Hugh AJR 89, Lynch Radiology 88

■ Situation

Périscissuraux toujours bénins

- lenticulaire ou triangulaire
- solide homogène
- contours réguliers
- < 10 mm grand axe
- 50% multiples

Ganglion intrapulmonaire

■ Densité spontanée

Calcifications

- Diffuse
- Nodulaire centrale
- Lamellaire concentrique
- Pop-corn
- Excentrée
- Microcalcifications dispersées

Bénin

■ Calcifications malignes

certaines métastases

6% carcinomes bronchiques

30% carcinoïdes

▪ Densité spontanée

Graisse

- -40 à -120 UH
- au centre du nodule

hamartome

lipome

pneumonie lipidique

Hamartome

- graisse
- calcifications pop corn
- contours lisses et réguliers
- diamètre < 25 mm

- Densité spontanée

Clartés internes

- Bronchogramme aérique et « bubble-like » lucencies en faveur de la malignité (adénocarcinome, lymphome)
- Excavation
 - ↳ épaisseur et régularité de la paroi

- Densité spontanée

Nodule solide

Nodule non solide

Nodule mixte

Densité tissulaire

Verre dépoli

Verre dépoli + tissulaire

Nodules non solides et mixtes

ELCAP scanner initial

Henschke AJR 02

	Nodules solides	Nodules non solides	Nodules mixtes
n	189	28	16
% malignité	7	18	63
% malignité après standardisation pour la taille	32	13	63

Taille du nodule
Composante tissulaire

Histologie

Yang AJR 01

- **Prise de contraste**

- **Prise de contraste nodules solides**

Swensen Radiology 00

Rehaussement < 15 UH → VPN 96% (91-99) pour malignité

Limites : petite taille, artefacts, hétérogénéité, protocole particulier

- **Cinétique de rehaussement par IRM**

Absence de rehaussement en faveur de la bénignité

Pourrait aider à distinguer certaines lésions bénignes de malignes

Manque de standardisation

Fujimoto Cancer Imaging 08

Les éléments du diagnostic

- Rapidité de croissance
- Temps de doublement (TD) des nodules malins 30-450 j
 - < 30 j n'exclue pas lymphomes, certaines métastases
 - > 450 j n'exclue pas carcinoïdes, certains adénocarcinomes
 - TD moyen nodules non solides 813 j
 - TD moyen nodules mixtes 457 j

Hasegawa Br J Radiol 00

[TD = $\log_2 \times \Delta t / \log(V_2/V_1)$
stabilité sur 2 ans $\Rightarrow$ TD 730 j]

- Limites des mesures manuelles des diamètres *Revel Radiology 04*
 - Défauts de justesse et de reproductibilité
 - Impact majeur sur le calcul du volume des petits nodules

Diamètre initial	Diamètre correspondant à un volume double du volume initial
1	1,26
5	6,3
10	12,6
20	25,2

- Logiciels de volumétrie
 - Protocole d'acquisition constant
 - Difficultés pour le verre dépoli
 - Variabilité volume inter-scanners → 25% *Goodman AJR 06*

image

GE image

(TV) 596 mm3

Size(mm) L-R:11.8 A-P:11.8 I-S:12.0

Les éléments du diagnostic

■ TEP 18-FDG

- Hyperfixation en rapport avec un hypermétabolisme du glucose
- Sensibilité 80-100% pour identifier les lésions malignes

↳ *faux négatifs*

nodule <8-10 mm

carcinoïdes

certains adénocarcinomes

- Spécificité 40-100%

Gould Chest 07

↳ *faux positifs*

infection, notamment à mycobactériose

sarcoïdose, anthraco-silicose

pneumonie organisée, infarctus pulmonaire ...

- Intérêt de détection d'autres sites hypermétaboliques

Les éléments du diagnostic

- Ponction transpariétale

- Technique

Nodule de 8-10 mm de diamètre minimum

Intérêt de la TEP pour cibler la zone la plus hypermétabolique

Cytogénétique sur le prélèvement pour les cas non chirurgicaux

- Performances

Sensibilité pour le diagnostic de malignité 90%

Les éléments du diagnostic

- **Histologie par vidéo-thoracoscopie**
- **Faisabilité**
 - taille-profondeur / plèvre
 - diamètre minimum 10 mm à 2 cm de la plèvre
 - consistance
 - difficulté pour les nodules non solides
- **Repérage pré-opératoire**
 - harpon, coil, bleu de méthylène

Stratégie diagnostique

- Estimation de la probabilité de malignité
 - Clinique
 - âge
 - tabagisme
 - ATCD néoplasique
 - Imagerie
 - taille
 - calcifications
 - graisse
 - vitesse de croissance
 -

Stratégie diagnostique

- **Nodule de type bénin**
- Calcifications de type bénin
 - diffuse
 - centrale
 - lamellaire concentrique
- Critères diagnostiques de l'atélectasie ronde
- Critères diagnostiques de l'hamartome
 - graisse ++
- Stabilité sur plusieurs années
 - ⇒ STOP ou surveillance

Stratégie diagnostique

- **Nodule fortement suspect de malignité**
 - Contours spiculés
 - Clartés internes, calcifications excentrées ou dispersées
 - Solide > 2 cm
 - Mixte persistant
 - Non solide $\geq$ 1 cm persistant

⇒ Histologie nécessaire

J20 Augmentin

Bilan préchirurgical d'un remplacement valvulaire aortique
Absence de tabagisme

Tuberculome

Stratégie diagnostique

Nodule solide indéterminé

Patient à risque intermédiaire ou élevé (clinique)

< 5 mm

5 à 10 mm

≥ 10 mm

TDM 12 M

TDM 3à6-9à12-24 M

Histologie
/ TEP

Patient à risque faible

< 5 mm

5 à 10 mm

≥ 10 mm

STOP (TDM 12 M ?)

TDM 6à12-18à24 M

TEP

Augmentation de volume ou fixation TEP ⇒ Histologie

Absence de fixation TEP

⇒ confronter à l'aspect scanographique, surveillance

Stratégie diagnostique

Nodule non solide

Contrôle persistance à 3 à 6 mois (ttt antibiotique)

< 5 mm

5 à 10 mm

≥ 10 mm

STOP

TDM 12-24-36-(48-60) M

Chirurgie

Augmentation de taille ou densité ⇒ Chirurgie

Nodule mixte

Contrôle persistance à 3 à 6 mois (ttt antibiotique)

Chirurgie

Conclusion

- Imagerie antérieure à rechercher dans tous les cas
- Très faible prévalence de lésions malignes si < 5 mm
- Nodule solide ≥ 1 cm chez un patient à risque
Nodule non solide persistant ≥ 1 cm
Nodule mixte persistant
 - ↳ prise en charge « active »
adaptée aux compétences locales