




L-BROUCHET - J-GIRON – P-FAJADET

H, 30 ans





Discrète dysphagie



TOGD dit : « normal ... »







UH : 38







Nouvelle TDM

(après épisode douloureux)



DIAGNOSTIC ?



GAMUT:


Tumeur paroi oeso bénigne ...myome (--)

Duplication oeso (+)

Kyste neuro entérique (+)

Kyste bronchogénique (+)

...autres ...?







DIAGNOSTIC :

Après chirurgie thoracique et digestive

L'Ana Path dit :

KYSTE BRONCHOGENIQUE





Lésions kystiques para oesophagiennes inférieures

Kyste bronchogénique

Kyste neuro entérique


Duplication oesophagienne

Les autres:

kyste hydatique médiastinal

T. neurogène, méningocèle

médiastinite et abcès médiastinal



Kyste bronchogénique

6-15 % T. médiastin

**20 % dans médiastin postérieur,
notamment para oesophagien**

Pas de malformation vertébrale associée



Kyste neuro entérique

**Lésion kystique la + fréquente du Médiastin
postérieur**

Plutôt à droite

**Associé souvent à malformation rachidienne:
hémi vertèbre, vertèbre papillon ...**

Parfois communicant = niveau hydroaérique



Duplication oesophagienne

20 % des duplications digestives

1/3 inférieur de l'œsophage

3/4 avant âge de 2 ans

TDM: paroi propre